

# LIDMESLIN PROCÉ

## MÉLANGE POUR CÉRÉALES IMMATURES



### BÉNÉFICES

#### SÉCURISE LES STOCKS DE FOURRAGE

- Planter des mélanges (céréales + pois + vesce) destinés à être ensilés permet de s'affranchir du risque de sécheresse estivale.
- Les aptitudes fourragères de chacune des variétés composant **LIDMESLIN PROCÉ** ont été déterminantes afin d'optimiser la quantité et la qualité du fourrage récolté.
- **LIDMESLIN PROCÉ** permet d'élever significativement les valeurs alimentaires, comparé aux méteils classiques (+ 0,02 à 0,05 UF/kg de MS).

#### INTÉRÊT ZOOTECHNIQUE

- Avec de faibles coûts en intrants, **LIDMESLIN PROCÉ** est une solution compétitive pour produire un fourrage abondant à moindre coût.
- Son intérêt est accru dès lors qu'il permet de bien valoriser toutes les UF ingérées par les animaux sans les gaspiller.

### CARTE D'IDENTITÉ

#### TYPE DE MÉLANGE

Légumineuse+Graminées

#### DURÉE


1 an

#### DENSITÉ DE SEMIS

125kg

### CONSEILS DE CULTURE

- Conserver par voie humide : enrubannage ou ensilage,
- Récolter lorsque le fourrage a atteint une teneur en matière sèche proche de 30-35% (stade laiteux - pâteux) lorsque l'éleveur recherche de la fibre ou dès la floraison du triticale pour optimiser la teneur en azote(enrubannage),
- Réaliser l'ensilage en coupe directe (limite la perte des grains et le salissement par la terre),
- Le fourrage doit être haché finement (longueur de brins : 2cm).e et des plantes à l'origine des refus.



[www.lidea-seeds.fr](http://www.lidea-seeds.fr)

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques, ainsi que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France. Mars 2021. Source: R&D Lidea



### UTILISATIONS

UTILISATIONS			POSITIONNEMENT				
Fauche	Mixte	Pâtutage	Sain et profond	Alternance hydrique	Hydromorphe	Sol séchant acide	Sol séchant calcaire
+++			+++	+++	+++	++	++

— Pas adapté    +Faible adaptation    ++ Adapté    +++ Très adapté    Source: Lidea



### COMPOSITIONS



ESPÈCES/VARIÉTÉS	
% en poids	Plantes/m <sup>2</sup> (150 kg/ha)
TRITICALE	
31 %	110
BLÉ	
20 %	65
AVOINE	
16 %	60
POIS FOURRAGER	
16 %	15
POIS PROTÉAGINEUX	
7 %	7
VESCE	
10 %	30



### FERTILISATION

- Dans la majorité des cas, la fertilisation n'est pas nécessaire,
- En conditions limitantes, un apport de 50 U d'azote peut être fait au stade tallage ou en sortie d'hiver.