

BOBAK

RAY-GRASS HYBRIDE



BÉNÉFICES

LA PRÉCOCITÉ D'UN ITALIEN

- Produit 103.3% par rapport aux témoins en 1ère coupe.

POUR UNE SYNTHÈSE ENTRE PRODUCTIVITÉ ET QUALITÉ

- En plus d'être performant sur la 1ère coupe, BOBAK marque aussi par son excellent potentiel de repousses d'arrière saison (106,7%)
- Faible teneur en fibres non-digestibles et hautes teneurs en sucre solubles.

LA FAIBLE REMONTAISON D'UN ANGLAIS

- Faible remontaison, la prairie reste feuillue après la 1ère coupe d'ensilage
- Qualité du feuillage est préservée grâce à l'excellente résistance face aux rouilles de BOBAK

NOM LATIN

Lolium hybridum

PLOÏDIE

Tétraploïde

TYPE

Italien

DENSITÉ DE SEMIS

25-30kg

CARTE D'IDENTITÉ

CONSEILS DE CULTURE


- Roulage obligatoire après le semis

SEMIS DE PRINTEMPS

- Semis de fin-février à mi-avril à privilégier sur les zones avec un faible stress hydrique d'été
- La pousse sans épis durant l'année du semis permet plusieurs exploitations au pâturage ; à défaut, une valorisation en fauche reste possible

SEMIS D'AUTOMNE

- Semis de mi-août à fin septembre
- En cas de semis précoce à l'automne, exploiter la prairie 70-80 jours après le semis
- La pousse précoce des printemps suivant le semis est adaptée pour une utilisation en ensilage
- Faible teneur en fibres non-digestibles et hautes teneurs en SSR



www.lidea-seeds.fr

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques, ainsi que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France. Avril 2021.

UTILISATIONS

| UTILISATIONS | | | POSITIONNEMENT | | | | |
|--------------|-------|----------|-----------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| Fauche | Mixte | Pâturage | Sain et profond | Alternance humide/sec | Hydromorphe | Sol acide et séchant | Sol calcaire et séchant |
| +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |

— Non adapté ++Adapté +++Très adapté

Source: Lidea

PRÉCOCITÉ

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Date d'épiaison | 4 mai |
| Date de redémarrage en végétation | 17 mars |
| Souplesse d'exploitation | 50 jours |

PRODUCTIVITÉ

Semis d'automne - Rendement de la 1ère coupe et au Printemps



QUALITÉ

Remontaison



Résistance à la verse



Teneur en sucres



Teneur en protéines



MALADIES

Résistance à la rouille



Résistance à la Xanthomonas



Résistance à la Helminthosporium



Lidea
FRESH IDEAS FOR AGRICULTURE